

Buprenorphine 0.4, 2, 8

قرص بوپرنورفین زیرزبانی ۰/۴ و ۲ و ۸ میلی گرم

مشخصات دارو:

هر قرص حاوی: ۰/۴ و ۲ یا ۸ میلی گرم بوپرنورفین (به صورت هیدروکلراید) به عنوان ماده مؤثره می باشد.

راهنمای مصرف:

- بیمار گرمی، لطفاً پیش از مصرف، این برگه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
- این راهنما را نزد خود نگه دارید زیرا ممکن است به خواندن مجدد آن نیاز پیدا کنید.
- از مصرف همزمان الکل، داروهای آرامبخش و خواب آور به همراه این دارو خودداری کنید.
- بی خطر بودن و کارایی این دارو برای کودکان به اثبات نرسیده است.
- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.
- چنانچه سؤال یا نکته مهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

موارد مصرف دارو:

سم زدایی در اعتیاد به اوپیوئیدها-کنترل درد متوسط تا شدید
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- در صورت اعتیاد به دارو
- مصرف برخی از داروها به خصوص ترکیبات مهار کننده مونوآمین اکسیداز
- مشکلات تنفسی و اختلالات کبدی
- در صورت بارداری

موارد منع مصرف و احتیاط:

در صورت اعتیاد به نارکوتیک ها، پیش از ترک اعتیاد از مصرف دارو خودداری شود.
در صورت حساسیت به این دارو یا سایر ترکیبات مشابه از مصرف آن خودداری شود.
افسراد زیر ۶ سال و کودکان مجاز به استفاده از این دارو نمی باشند.

در موارد زیر دارو با احتیاط مصرف شود:

افراد سالمند و ناتوان، می نظامی عملکرد غده تیروئید، طی دوره بارداری و شیردهی، نارسایی آدرنال، سابقه آسیب به سر و ضایعات درون جمجمه ای، هیپرپلازی پروستات، نارسایی شدید کلیه و کبد و ریه، انسداد مجاری ادرار، دپرسیون عصبی، الکلیسم حاد، کما، سندرم محرومیت از الکل و کیفوسکولیوز.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

■ طی دوره بارداری و شیردهی به احتیاط و تنها در صورت لزوم تجویز شود. یعنی مصرف این دارو در زنان شیرده به اثبات نرسیده است.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مصرف دارو در کنترل دردهای متوسط تا شدید در افراد بالای ۱۲ سال می باشد.
مجموعین از این دارو به فرم تزریقی به عنوان داروی قبل از بییهوشی با دوز ۰/۳ میلی گرم عضلانی و قبل از بییهوشی به عنوان پره مدیکاسیون و با دوز ۴/۵-۱۲ mg/kg در بییهوشی بالانس شده و با ۰/۳ میلی گرم عضلانی برای کنترل درد بعد از عمل جراحی توصیه می شود.

مصرف دارو در صورت لزوم در افراد کمتر از ۴ سال با در نظر گرفتن وزن و مطابق تجویز پزشک خواهد بود.
قرص های زیر زبانی بوپرنورفین را باستانی در زیر زبان قرار داد تا کاملاً حل گردد و از جویدن یا بلعیدن آن خودداری شود.

Buprenorphine 0.4, 2, 8

تداخلات دارویی:

- تقویت تأثیر داروهای مهارکننده اعصاب مرکزی و مهار کننده MAO توسط بوپرنورفین.
- تشدید دپرسیون عصبی، تنفسی و کلاپس قلبی - عروقی ناشی از بوپرنورفین توسط داروهای بیهوشی باربیتوراتی و دیازپام.
- در صورت استفاده همزمان ممکن است از تأثیر ضد دردی مسکن نارکوتیک بکاهد.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

شایع ترین: سرگیجه، خواب آلودگی، سردرد، هیپوتانسیون، میوزیس، تهوع و تعریق.

مهم ترین: افزایش فشار داخل جمجمه ای، دپرسیون تنفسی.

سایر عوارض: گیجی، عصبی بودن، احساس سرخوشی، برادی کاردی، تاکی کاردی، هیپرتانسیون، تاری دید، استفراغ، بیوست، احتباس ادرار، هیپوتنزیلاسیون و رخاشار.

مسمومیت درمانی:

گاهی حتی با دوزهای درمانی نیز ممکن است دپرسیون عصبی تنفسی ایجاد نماید، جهت درمان مسیر تنفسی بیمار را باز نگه دارید. اکسیژن، تزریق وریدی مایعات، استفاده از داروهای تنگ کننده عروق، از جمله اقدامات حمایتی است که می توان در موارد مسمومیت و بروز دپرسیون تنفسی انجام داد. راه عمده کمک مکابیکی به دستگاه تنفسی است. می توان از نالوکسان یا دوکسپرام نیز استفاده نمود.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

دارو را در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید و از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

بسته بندی:

قرص های زیرزبانی بوپرنورفین ۰/۴ و ۲ و ۸ میلی گرم توسط شرکت داروسازی فاران شیمی تولید شده و هر ۱۰ قرص در یک بلیستر و هر ۱۰ بلیستر به همراه یک پرشور در یک جعبه قرار می گیرد.

دپارتمان حمایت از بیماران فاران پلاس با هدف اطلاع رسانی های دارویی و پاسخگویی به سوالات بیماران مصرف کننده محصولات این شرکت فعالیت می کند. به منظور راهنمایی هر چه بهتر بیماران در تمامی مسیر درمان، با فاران پلاس (سامانه حمایت از بیماران) تماس بگیرید.

فاران
گروه مراقبت سلامت

Ref. :

Drug facts & Comparisons, 2010, Pages: 1148-1165
Martindale, the complete drug reference, 36ed, Pages 82-85

ساخت شرکت داروسازی فاران شیمی



تهران، میدان ونک، خیابان خدماتی، خیابان نیروی انتظامی، بن بست کاوه، پلاک ۳

تلفن: ۵۷۹۴۱۰۰۰ ۵۷۹۴۱۴۴۴ سامانه حمایت از بیماران: www.faranshimi.com

Faran Shimi
Pharmaceutical Co.