

# Faroxyphen

325/5, 325/10

Acetaminophen 325 / Oxycodone 5

Acetaminophen 325 / Oxycodone 10

## مشخصات دارو:

هر قرص فاروکسیفن ۳۲۵/۵ حاوی ۳۲۵ میلی گرم استامینوفن و ۵ میلی گرم اکسی کدون هیدروکلراید و هر قرص فاروکسیفن ۳۲۵/۱۰ حاوی ۳۲۵ میلی گرم استامینوفن و ۱۰ میلی گرم اکسی کدون هیدروکلراید به عنوان ماده موثره می باشد.

## راهنمای مصرف:

بیمار گرامی، لطفاً پیش از مصرف، این برگه راهنما را به دقت مطالعه نمایید. این راهنما را نزد خود نگه دارید زیرا ممکن است به خواندن مجدد آن نیاز پیدا کنید. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید. چنانچه سوال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظر تان رسید با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

## موارد مصرف:

تسکین دهنده ی دردهای متوسط تا شدید.

## موارد منع مصرف:

- حساسیت به اکسی کدون، استامینوفن و یا هر یک از اجزا این فرآورده
- آسم حاد و یا شدید
- در صورت ابتلا یا احتمال ابتلا به انسداد روده
- دپرسیون تنفسی

## مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید، اما مقدار مصرف معمول قرص فاروکسیفن به شرح ذیل است: دوز معمول دارو در صورت درد برای بزرگسالان یک قرص هر ۶ ساعت یک بار است. حداکثر دوز روزانه استامینوفن نباید بیش از ۴ گرم و اکسی کدون بیش از ۶۰ میلی گرم باشد. ■ در صورت فراموشی یک نوبت از مصرف فاروکسیفن، به محض یادآوری دوز فراموش شده را مصرف نمایید. اما اگر تقریباً زمان دوز بعدی فرارسیده بود، از مصرف دوز فراموش شده خودداری نمایید و دوز بعدی را نیز دو برابر نسازید.

## در صورت مصرف بیش از حد:

- در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده، بلافاصله جهت مشاوره با پزشک یا اورژانس تماس بگیرید، حتی اگر علائمی از ناراحتی یا مسمومیت وجود نداشته باشد.
- علائم مصرف بیش از حد: کندی تنفس، گیجی و خواب آلودگی شدید

## مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در دوران بارداری در رده C قرار دارد.
- مصرف این دارو در زمان زایمان و یا قبل از آن به علت احتمال اثر بر سیستم تنفس نوزاد منع مصرف دارد.
- این دارو به علت ترشح در شیر مادر در زمان شیردهی منع مصرف دارد.

## هشدارها و احتیاط:

- مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود، لذا حین درمان، از رانندگی و یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
- از مصرف این دارو در افراد سالمند یا سابقه زمین خوردن و شکستگی خودداری نمایید.
- مصرف این دارو ریسک بالای اعتیاد و سوء مصرف دارد. در بیمارانی که سابقه خانوادگی اعتیاد دارند، پایش بیمار پیشنهاد می شود.

# Faroxyphen

325/5, 325/10

Acetaminophen 325 / Oxycodone 5

Acetaminophen 325 / Oxycodone 10

- **احتمال** آسیب کبدی در دوزهای بالای ۴ گرم استامینوفن و یا فرآورده‌هایی که حاوی استامینوفن هستند و همچنین افرادی که با وجود بیماری کبدی مصرف همزمان الکل دارند **بیشتر** است. لذا از مصرف بیش از این مقدار و مصرف همزمان با فرآورده‌های حاوی استامینوفن خودداری نمایید.
- در صورت مصرف هم‌زمان با داروهای سروتونرژیک، داروهای سرکوب‌کننده سیستم عصبی مرکزی و داروهای آنتی‌کولینرژیک با پزشک خود مشورت نمایید.
- افراد مبتلا به بیماری‌های صفراوی و پانکراتیت به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی قرار گیرند.
- در صورت حساسیت به کدئین، وابستگی جسمی و روانی و کاهش سطح هوشیاری با پزشک خود مشورت نمایید.
- مصرف همزمان این دارو با داروهای MAOI و تا ۱۴ روز پس از قطع مصرف آن‌ها توصیه نمی‌شود.
- در صورت رخ دادن واکنش‌های آلرژیک، شوک آنافیلاکسی و سندروم استیون‌جانسون، بلافاصله مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه نمایید.
- در صورت ابتلا به کم‌کاری تیروئید، هیپرترافی پروستات و بیماری آدیسون، قبل از مصرف فاروکسیفن با پزشک مشورت نمایید.

## تداخلات دارویی:

از مصرف همزمان این دارو با داروهای زیر خودداری نمایید:  
**نالتروکسان**، آزلاستین، کونیوپتان، ضد دردهای اپیوئیدی، تالیدوماید، پروبنسید، سن جان ورت (گیاه علف‌جای)، وریکونازول، زولپیدم، باکلوفن و الکل.

## عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه‌ی این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

- **عوارض شایع:** استفراغ و تهوع، بی‌خوابی، سردرد، سرگیجه
- **عوارض جدی:** افت فشار خون، شوک، سندروم استیون‌جانسون، نگرز سمی اپیدرم، نوتروپنی، اگرانولوسیتوز، مشکلات کبدی، واکنش‌های حساسیتی و دپرسیون تنفسی.

## شرایط نگهداری دارو:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

## بسته بندی:

قرص‌های فاروکسیفن ۳۲۵/۵ و ۳۲۵/۱۰ میلی‌گرم توسط شرکت داروسازی فاران شیمی تولید شده و هر ۱۰ قرص در یک بلیستر و هر ۳ بلیستر به همراه یک برگه راهنما در یک جعبه‌ی ۳۰ عددی قرار می‌گیرد.

دیارتمان حمایت از بیماران فاران پلاس با هدف اطلاع‌رسانی‌های دارویی و پاسخگویی به سوالات بیماران مصرف‌کننده محصولات این شرکت فعالیت می‌کند. به منظور راهنمایی هر چه بهتر بیماران در تمامی مسیر درمان، با فاران پلاس (سامانه حمایت از بیماران) تماس بگیرید.

# فاران

گروه مراقبت سلامت

Ref. :  
PDR  
USPDI  
DRUG FACTS  
Drug points 2017 (USPDI)

ساخت شرکت داروسازی فاران شیمی



Faran Shimi  
Pharmaceutical Co.

تهران، میدان ونک، خیابان خداسی، خیابان نیروی انتظامی، بن بست کاوه، پلاک ۳  
تلفن: ۰۲۱-۵۷۹۴۱۰۰۰ سامانه حمایت از بیماران: ۰۲۱-۵۷۹۴۱۴۴۴  
www.faranshimi.com