

تنطور اپيوم ۱٪ - فاران

مشخصات دارو:

هر ۵ میلی لیتر حاوی ۵۰ میلی گرم مورفین به عنوان ماده موثره می باشد.

راهنمای مصرف:

- بیمار گرمی، لطفاً پیش از مصرف، این برگه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
- این راهنما را نزد خود نگه دارید زیرا ممکن است به خواندن مجدد آن نیاز پیدا کنید.
- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.
- چنانچه سوال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان برسد با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

موارد مصرف:

سم زدایی در اعتیاد به اپیوئیدها و درمان اسهال (در اسهال ناشی از مواد سمی توصیه نمی شود).

موارد منع مصرف:

از مصرف این دارو در صورتی که به ترکیبات اپیوئیدی حساسیت دارید خودداری نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- طبقه بندی مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی جز گروه C می باشد.
- مصرف دارو در دوران شیردهی به دلیل ترشح آن در شیر مادر تنها در موارد اضطراری و با نظر پزشک متخصص باید انجام شود.

هشدارها و احتیاط:

- احتمال بروز وابستگی روانی، فیزیکی، اعتیاد و سوء مصرف به تنطور اپیوم وجود دارد.
- مواردی از ضعف تنفسی شدید و مرگ در صورت مصرف بیش از دوز دارو به تنهایی یا همراه با داروهای تضعیف کننده سیستم عصبی مرکزی (از جمله الکل) گزارش شده است.
- مصرف این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی یا کلیوی طبق نظر پزشک و با تعدیل دوز باید انجام شود.
- مواردی از طولانی شدن ریتم قلبی و آریتمی با مصرف دوزهای بالای این دارو به خصوص در افرادی که به طور همزمان از داروهای دیورتیک استفاده کرده یا هیپوکالمی (کاهش پتاسیم در خون)، هیپومنیزمی (کاهش منیزیم در خون) و هیپرتروفی قلب (بزرگ شدن بیش از اندازه قلب) دارند، مشاهده شده است.
- مصرف این دارو در بیماران که دیگر اپیوئیدها از جمله پتیدین، بیهوش کننده های عمومی، فنوتیازین ها، خواب آورها، آرامبخش ها، ضداسفردگی های سه حلقه ای و دیگر داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی (از جمله الکل) را مصرف می کنند، باید با احتیاط و با کاهش دوز صورت پذیرد.
- بی خطر بودن و کارایی این دارو بسرای کودکان به اثبات نرسیده است.
- انتخاب مقدار مصرف برای بیماران سالخورده باید با احتیاط صورت گیرد.
- بعد از مصرف طولانی مدت با این دارو از قطع یکباره آن خودداری کنید.

تداخلات دارویی:

- در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع سازید.
- مصرف همزمان با سایر داروها، از جمله ضددردهای مخدر، آنتی هیستامین ها، مهار کننده های مونوآمین اکسیداز (MAO)

فنوتیازین ها، باربیتورات ها، بنزودیازپین ها، داروهای آرام بخش و خواب آور، ضد افسردگی های سه حلقه ای، الکل و شل کننده های عضلانی، سبب تشدید اثرات تضعیف سیستم اعصاب مرکزی و تنفسی می شود.

- مصرف همزمان با سامیتیدین ممکن است باعث تضعیف سیستم اعصاب مرکزی شود.
- مصرف همزمان با بیپوش کننده های عمومی ممکن است موجب تضعیف شدید دستگاه قلبی- عروقی شود.
- استفاده توأم با زیدوودین ممکن است باعث واکنش توکسیک به هر کدام یا هر دو دارو شود.
- مصرف داروهای آنتاگونیست مخدر (نالوکسان) در بیماران که وابستگی جسمی به مورفین دارند، ممکن است سبب بروز سندروم شدید قطع مصرف دارو شود.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

- در بیماری که از تطور اپیوم جهت ترک اعتیاد استفاده می کنند، مقدار مصرف دارو بر اساس نظر پزشک تعیین می شود.
- قطع مصرف این دارو به علت امکان بروز سندروم ترک باید تحت نظر پزشک و به صورت تدریجی باشد.
- علائم ترک اپیوئیدها که در هنگام قطع مصرف آنها ممکن است بروز نمایند عبارتند از: کاهش ضربان قلب و تعداد تنفس، کاهش فشار خون، تعریق، تهوع، اسهال و از دست دادن مایعات بدن.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا دارو ساز مشورت کنید.

تهوع و استفراغ، بیخوابی، خواب آلودگی، کاهش فشار خون و تضعیف تنفس در مقادیر مصرف زیاد، اشکال در ادرار کردن، اسهال، کبسه صفرا یا منانه، خشکی دهان، تعریق، سردرد، برافروختگی صورت، سرگیجه، کاهش ضربان قلب، کاهش دمای بدن، توهم، حالت خماری، تغییر در خلق و خو، وابستگی، اختلال در تفکر، تنگی در مردمک چشم، بشورات جلدی، کهیر و خارش از عوارض جانبی این دارو هستند.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده، سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری دارو:

- دارو را دور از نور مستقیم و حرارت نگهداری و از یخ زدگی محافظت کنید.
- **دارو را جدا دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نماید.**
- از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید و اطمینان داشته باشید که داروی تاریخ گذشته دور از دسترس کودکان قرار داشته باشد.

بسته بندی:

تتطور اپیوم 50mg/5ml در شیشه های ۲۵۰ میلی لیتری توسط شرکت داروسازی فاران شیمی تولید می شود.

دپارتمان حمایت از بیماران فاران پلاس با هدف اطلاع رسانی های دارویی و پاسخگویی به سوالات بیماران مصرف کننده محصولات این شرکت فعالیت می کند. به منظور راهنمایی هر چه بهتر بیماران در تمامی مسیر درمان، با فاران پلاس (سامانه حمایت از بیماران) تماس بگیرید.

فاران

گروه مراقبت سلامت



ساخت شرکت داروسازی فاران شیمی

تهران، میدان ونک، خیابان خدای، خیابان نیروی انتظامی، بن بست کاوه، پلاک ۳

تلفن: ۰۲۱-۵۷۹۴۱۰۰۰ سامانه حمایت از بیماران: ۰۲۱-۵۷۹۴۱۴۴۴ www.faranshimi.com

Faran Shimi
Pharmaceutical Co.