



هر قرص روکشدار حاوی ۱۰ و یا ۲۰ میلی گرم رزوواستاتین (تصورت کلسیم) به عنوان ماده موشره می باشد.

### راهنمایی های عمومی:

#### بیمار گرامی:

لطفاً پیش از مصرف، این برگه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در مورد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- این راهنما را نزد خود نگهدارید زیرا ممکن است به خواندن مجدد آن نیاز پیدا کنید.

### ■ دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- چنانچه سوال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید با پژوهش یا داروساز خوبش تماس بگیرید.

#### موارد مصرف:

- داروی کمکی همراه با رژیم غذایی به منظور کاهش سطح کلسترول تام خون، LDL-C، آپولیپوپروتئین B، HDL-C و تری گلیسیرید و همچنین افزایش سطح HDL در بیماران با هایپرلیپیدمی اولیه (بالا بودن میزان چربی های خون) یا دیس لیپیدمی ناهمگون.

- داروی کمکی برای بیماران با هایپر کلسترولویمیا هموزیگوت فامیلی (بالا بودن میزان کلسترول در خون)

- داروی کمکی همراه با رژیم غذایی به منظور کاهش سرعت پیشرفت آترواسکلروز در بیماران بزرگسال به منظور کاهش کلسترول تام و LDL خون.

#### موارد منع مصرف:

- در بیماران با بیماری کبدی فعال منع مصرف دارد به خصوص افراد با سطح ترانس آمیناز بالا در صورت وجود هرگونه حساسیت به این دارو و نارسایی کبدی از مصرف آن باید اجتناب شود.

- در افراد با پرتوئینوری و همچوچری باید کاهش مقدار مصرف دارو در نظر گرفته شود.

- مصرف این دارو در دوران شیردهی، دوران بارداری و یا در خانم هایی که احتمال بارداری دارند منوع می باشد.

#### مقدار و نحوه مصرف:

- مقدار مصرف هر دارو را پژوهش معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول قرص رزوواستاتین به شرح ذیل است:

- دوز معمول روزانه دارو در بزرگسالان به میزان ۵ تا ۴۰ میلی گرم می باشد.

- دوز پیشنهادی جهت شروع درمان روزانه ۱۰ میلی گرم می باشد. در بیماران با چربی خون پیش از ۱۹۰ mg/dL، دوز شروع درمان روزانه ۲۰ میلی گرم می باشد.

- در شروع درمان تا تثبیت دوز دریافتی روزانه، سطح چربی های خون می باشد هر ۲ تا ۴ هفته یکبار مورد آزمایش و بررسی قرار بگیرد.

- قرص های رزوواستاتین همراه با مقدار کافی آب بلعیده شود از جویدن یا شکستن قرص ها خودداری نمایید. مصرف این دارو می تواند همراه با غذا یا بدون غذا باشد.

#### مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- این دارو در دوران بارداری و شیردهی منع مصرف دارد.

#### هشدارها و احتیاط:

- این دارو در کنترل سطح کلسترول خون تائیر دارد و درمان کننده نیست، رژیم غذایی با دریافت

- پایین کلسترول و چربی های اشباع در روند درمان کمک کننده خواهد بود.
- بیمارانی که دچار کم کاری تیروئید هستند قبل از مصرف رزوفاستاتین باید آن را درمان کنند.
- در افراد با سابقه مصرف الکل و یا بیماری مزمن کبدی با احتیاط مصرف شود.
- تجویز دارو برای بیمارانی که میوپاتی را تجربه کرده اند و یا نارسایی کلیوی ثانویه و رابدومیولیز دارند باید با احتیاط صورت گیرد.
- خانم هایی که در معرض بارداری هستند باید از یک روش مطمئن پیشگیری از بارداری در طول مصرف دارو استفاده نمایند.
- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده پزشک، بیمار باید به مراکز درمانی رسانده شود.

### تداخلات دارویی:

- مصرف همزمان این دارو با جسم فیبروزیل، سایر فیبرات ها و نیاسین، سیکلوسپورین ریسک بروز میوپاتی را افزایش می دهد.
- مصرف همزمان این دارو با داروهای آنتی اسید، منجر به کاهش اثر بخشی آن می شود. توصیه می شود فاصله زمانی دو ساعت بین مصرف رزوفاستاتین و آنتی اسیدها وجود داشته باشد.
- مصرف همزمان این دارو با وارفارین می تواند منجر به افزایش اثر بخشی رزوفاستاتین و همچین تاثیر بر فاکتور های خونی موثر در روند درمان با وارفارین شود.

### عوارض جانبی:

هر دارو به موارز اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. گرفتگی یا درد عضلانی، درد شدید شکمی، خستگی یا ضعف غیر معمول، رابدومیولیز (وجود هموگلوبین در ادرار)، اختلال کار کرد کبدی، افزایش میزان آنزیم های کبدی، عوارضی که تنها در صورت ادامه یافتن نیاز به مراجعته پزشکی دارند: سردرد، گلودرد، دردهای شکمی، اضطراب، درد مفاصل، ضعف، درد قفسه سینه، کمردرد، برونشیت، اسهال، سرگیجه، سوء هاضمه، نفخ، التهاب معده و روده، بی خوابی، درد عضلانی، راش و بشورات پوستی.

### شرایط نگهداری دارو:

- دارو را دور از نور مستقیم، رطوبت، حرارت و دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- از مصرف و نگهداری داروی تاریخ گذشته خودداری کنید و اطمینان داشته باشید که داروهای تاریخ گذشته دور از دسترس کودکان قرار داشته باشد.
- قرص رزوفاستاتین باید در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی دارو نگهداری شود.

### بسته بندی:

قرص های فارستور ۱۰ و ۲۰ میلی گرمی توسط شرکت داروسازی فاران شیمی تولید شده و هر ۱۴ قرص در یک بلیستر بصورت ALU-ALU و هر ۲ بلیستر ALU-ALU به همراه یک بروشور در یک جعبه ۲۸ عددی قرار می گیرد.

ساخت شرکت داروسازی فاران شیمی



Faran Shimi  
Pharmaceutical Co.

تهران، میدان ونک، خیابان خاموسی، خیابان نیروی انتظامی، بین بست کاوه، پلاک ۳

تلفن: ۵۷۹۴۱۰۰۰ سامانه حمایت از بیماران: www.faranshimi.com