

FaroXY

Oxycodone

5mg & 15mg & 30mg

مشخصات دارو:

هر قرص روکشدار حاوی ۵ و یا ۱۵ و یا ۳۰ میلی گرم اکسی کدون هیدروکلراید به عنوان ماده موثره می باشد.

راهنمای مصرف:

- بیمار گرامی، اطفاً پیش از مصرف، این برگه راهنمای را به دقت مطالعه نمایید.
- این راهنمای را تزدی خود نگه دارید زیرا ممکن است به خواندن مجدد آن نیاز پیدا کنید.
- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.
- چنانچه سوال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید با پرسشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

موارد مصرف دارو:

کنترل درد متوسط تا شدید در افراد بالای ۱۲ سال

موارد منع مصرف:

- در صورت حساسیت مفرط نسبت به هریک از اجزای قرص منع مصرف دارد.
- از مصرف این دارو در صورتی که به ترکیبات اوپیوئیدی حساسیت دارید خودداری نمایید.
- در صورت ابتلا به ضعف تنفسی شدید، آسم پرونژیتی حاد یا مزمن، هیپرکربی (مقادیر زیاد دی اکسید کربن در خون) و فلنج ایلنوس این دارو منع مصرف دارد.
- مصرف این دارو در کودکان زیر ۱۲ سال توصیه نمی شود.

صرف در دوران بارداری و شیردهی:

- طبقه بندی مصرف دارو در دوران بارداری، جزء گروه B می باشد.
- آزمایش این دارو در جانواران آزمایشگاهی، خطری را برای جنبش نشان نداده است، اما مطالعات کافی و معتبر از بی خطر بودن مصرف دارو در دوران بارداری در دسترس نمی باشد.
- این دارو در شیر ترشی می شود اما اثرات جدی در نوزاد مشاهده نشده است.
- توصیه می شود در صورت لزوم مصرف فاروکسی توسعه مادران شیرده، تغذیه نوزادان توسط شیر مادر پس از ۶-۴ ساعت از مصرف دارو صورت پذیرد.

هشدارها و موارد احتیاط:

- احتمال بروز واپستگی روانی، غیریکی و تحمل در صورت مصرف طولانی مدت فاروکسی وجود دارد.
- مواردی از ضعف تنفسی شدید و مرگ در صورت مصرف پیش از حد دارو به تنها یا همراه با دیگر داروهای تعییف کننده سیستم عصبی مرکزی (از جمله الکل) گزارش شده است.
- مصرف این دارو در بیماران دارای اعیانه بال کل و اوپیوئیدها به علت افزایش احتمال واستگی و تحمل، باید با احتیاط صورت پذیرد.
- مصرف این دارو در بیماران متلاطه نارسایی شدید کبدی یا کلیوی طبق نظر پزشک و با تعديل دوز باید انجام شود.
- بی خطر بودن و کارایی این دارو برای کودکان زیر ۱۲ سال به اثبات نرسیده است.

در موارد زیر دارو باید با احتیاط مصرف شود:

- نارسایی ریسوی، آسم و دیگر اختلالات تنفسی، آسیب به سر و افزایش فشار داخل جمجمه ای، ساقمه اختلالات نشنجی، در افراد سالماند و ناتوان، در دوران بارداری و شیردهی، بالا بودن فشار داخل چشم، الکلیسم حاد، کم کاری غده تیروئید، بیماری آدیسون، کیفواسکولیوز، هیپرتروفی پروستات، انسداد مجرای ادراری، دیرسیون عصیانی، کما، بیماری های قلبی-عروقی، گرفتگی عروق مغزی و التهاب دستگاه گوارش.

تدخالتات دارویی:

- در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پرسش خود را مطلع سازید.
- تقویت اثر بخشی داروهای تعییف کننده سیستم اعصاب مرکزی همچون الکل، خواب آورها، داروهای ضد اضطراب و بیهوش کننده ها.
- تشدید دیرسیون تنفسی، عصیانی و کلابیس قلبی عروقی ناشی از فاروکسی توسط داروهای بیهوشی باربیتوراتی، ضد افسردگی های سه حلقه ای و مهار کننده های MAO.

FaroXY

Oxycodone

5mg & 15mg & 30mg

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را بپژشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

- در بیمارانی که برای اولین بار از ضددردهای اوپیوئیدی استفاده می کنند، دوز تجوییز دارو به میزان ۵ تا ۱۵ میلی گرم هر ۴ ساعت می باشد.

- مصرف روزانه فاروکسی به میزان ۱۰ تا ۳۰ میلی گرم هر ۴ ساعت می باشد که در موارد درد شدید، دوزهای بیش از ۳۰ میلی گرم می تواند تجوییز شود.

▪ قطع مصرف این دارو به علت امکان بروز سنتورم ترک باید تحت نظر پژشک و به صورت تدریجی باشد.

علامت ترک اوپیوئیدها که در هنگام قطع مصرف دارو امکان دارد رخ دهنده عبارت است از:

کاهش ضربان قلب و تعداد تنفس، افت فشار خون، تعریق، تهوع، اسهال و از دست دادن مایعات بدن.

قرص های فاروکسی را همراه مقدار کافی آب میل و از شکستن یا جویدن قرص ها خودداری نمایید.

عواراض جانبی دارو:

- هر دارو به موارد اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر با پژشک یا داروساز مشورت نمایید.

- شایع ترین آنها عبارتند از: تهوع، استفراغ و بیوست، سرگیجه، سردرد، برادری کاردي، افزایش یا کاهش فشارخون، اضطراب، ضعف، سستی، اسهال، تعریق، اسیاسی عضلات اسکلتی و خواب آلودگی.

▪ عوارض جدی و خطورنگ: دبرسیون تفسی، دبرسیون قلبی، آپنه، ایست تفسی و قلی، کما و شوک.

▪ علامت مصرف بیش از حد: دبرسیون تنفسی، افت فشار خون، گشاد شدن مردمک ها، گشاد شدن عروق و کما.

▪ در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده، سریعاً به پژشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری دارو:

- دارو را در دمای کمتر از ۲۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- دارو را در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید و از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

بسته بندی:

- فرمان های روکشدار فاروکسی ۵، ۱۵ و ۳۰ میلی گرم توسط شرکت داروسازی فاران شیمی تولید شده و هر ۱۰ قرص در یک بلیستر و هر ۶ بلیستر به همراه یک بروشور در یک جعبه قرار می گیرد.

دپارتمان حمایت از بیماران فاران پلاس با هدف اطلاع رسانی های دارویی و پاسخگویی به سوالات

بیماران مصرف کننده محصولات این شرکت فعالیت می کند. به منظور راهنمایی هر چه بهتر بیماران

در تماسی مسیر درمان، با فاران پلاس (سامانه حمایت از بیماران) تماس بگیرید.

فاران
گروه مراقبت سلامت

Ref. :

Drug facts and comparisons, 2008, pages: 517, 529, 530, 539-544
Martindale, the complete drug reference, 36 Ed, pages: 103 - 107

ساخت شرکت داروسازی فاران شیمی

تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، خیابان نیروی انتظامی، بن سیست کاوه، پلاک ۲

تلفن: ۰۵۹۴۱۰۰ سامانه حمایت از بیماران: ۰۵۷۹۴۱۴۴۴
www.faranshimi.com



Faran Shimi
Pharmaceutical Co.