

FaroXy-ER 10mg, 20mg & 40mg

Oxycodone Extended-Release

مشخصات دارو:

هر قرص روکشدار حاوی ۱۰، ۲۰ و ۴۰ میلی گرم اکسی کدون هیدروکلراید پیوسته رهش به عنوان ماده موثره می باشد.

راهنمای مصرف:

- لطفاً پیش از مصرف، این برگه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.
- این راهنما را نزد خود نگه دارید زیرا ممکن است به خواندن مجدد آن نیاز پیدا کنید.
- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- چنانچه سوال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

موارد مصرف دارو:

فاروکسی پیوسته رهش از دسته آلکالوئیدهای نیمه سنتتیک اپیوئیدی است و به عنوان ضد درد برای تسکین دردهای متوسط تا شدید تجویز می شود.

موارد منع مصرف:

- هرگونه حساسیت به اکسی کدون و یا هر یک از اجزای این فرآورده
- دپرسیون تنفسی شدید، بیماری های انسداد مجاری ریوی، آسم، فلج روده (فلج ایلئوس) و انسداد مجرای گوشاری

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- فاروکسی پیوسته رهش می تواند از جفت عبور کند بنابراین مصرف این دارو در بارداری می بایست صرفاً در صورت ضرورت و صلاح دید پزشک صورت گیرد.
- فاروکسی پیوسته رهش در شیر مادر ترشح می شود لذا جهت مصرف این دارو در دوران شیردهی با پزشک خود مشورت نمایید.

هشدارها و موارد احتیاط:

- مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود، لذا حین درمان، از رانندگی و یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.
- در صورت سن بالا و ناتوانی جسمی، نارسایی شدید ریوی، کلیوی و کبدی، نارسایی غده تیروئید، نارسایی غده آدرنال (بیماری آدیسون)، هایپرتروفی پروستات، وابستگی یا اعتیاد به الکل و اپیوئیدها، پانکراتیت، فشار بالای مغز (افزایش ICP)، انسداد در مجرای صفراوی و یا حالب، سابقه تشنج، مصرف داروهای ضدافسردگی از دسته مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (MAOIs)، آریتمی، آنمی و هیپوپروترومینمیا، این دارو را با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف نمایید.

در صورت مصرف بیش از حد:

- در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده، بلافاصله جهت مشاوره با پزشک یا اورژانس تماس بگیرید حتی اگر علائمی از ناراحتی یا مسمومیت وجود نداشته باشد.
- **علائم مصرف بیش از حد شامل:** تنگ شدن مردمک چشم، دپرسیون تنفسی، شل شدن ماهیچه های اسکلتی، کاهش فشارخون، بی حالی و خواب آلودگی شدید، کما، کاهش ضربان قلب و تجمع آب در ریه (non-cardiogenic Pulmonary edema) می باشد.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف فاروکسی پیوسته رهش، از دوبرابر کردن دوز بعدی دارو خودداری نمایید.
- از قطع ناگهانی مصرف این دارو خودداری نمایید. قطع مصرف این دارو می بایست به صورت تدریجی و تحت نظر پزشک انجام گیرد.
- مصرف این دارو در کودکان زیر ۱۲ سال توصیه نمی گردد.

تداخلات دارویی:

- در صورت ابتلا به هرگونه بیماری، قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید. مصرف همزمان این دارو با سایر داروها خصوصاً داروهای زیر می بایست با احتیاط و تحت نظر پزشک متخصص انجام گیرد.
- داروهایی که باعث کاهش فعالیت سیستم اعصاب مرکزی می شوند مثل آرام بخش ها و خواب آورها، داروهای ضد سرع و داروهای با اثر آنتی کولینرژیک مثل داروهای آنتی سایکوز، آنتی هیستامین ها و ضد تهوع ها، سایر اپیوئیدها و الکل که باعث تشدید دپرسیون تنفسی می شوند، پاراسمیواتیمیتیک ها و داروهای که در درمان پارکینسون استفاده می شوند.

FaroXy-ER 10mg, 20mg & 40mg

Oxycodone Extended-Release

■ سایمتیدین

■ مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز (MAOIs)

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

■ دوز اولیه معمول در افراد بزرگسال بالای ۱۲ سال: ۱۰ میلی‌گرم در هر ۱۲ ساعت

■ دوز نگهدارنده فاروکسی پیوسته رهش بر اساس صلاح دید پزشک و پاسخ بیمار به درمان می‌تواند تا ۲۲۰ میلی‌گرم در روز افزایش یابد.

■ در صورت پایین بودن وزن بیمار یا ابتلا به بیماری‌های کبدی و کلیوی مصرف این دارو می‌بایست تحت نظر پزشک و با دوز پایین‌تر آغاز شود.

■ از شگستن و جویدن فاروکسی پیوسته رهش خودداری نمایید زیرا باعث آزادسازی مقدار بیشتری دارو در زمان مشخص می‌شود.

عوارض جانبی دارو:

■ شایع‌ترین عوارض این دارو بی‌قراری، گیجی و سستی، خواب‌آلودگی، سردرد، یبوست، تهوع و استفراغ، خارش، افزایش فشارخون، افت فشارخون وضعیتی، تب، دپرسیون تنفسی، خشکی دهان، تاکی‌کاردی، کاهش اشتها، برونکواسپاسم، تعریق و لرزش می‌باشد.

شرایط نگهداری دارو:

■ دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و درون جعبه نگهداری نمایید.

■ دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

■ از مصرف و نگهداری داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

بسته بندی:

قرص فاروکسی پیوسته رهش فاران شیمی با دوزهای ۲۰، ۱۰ و ۴۰ میلی‌گرم در بلیسترهای ۱۰ عددی تولید شده و هر ۶ بلیستر همراه یک برگه راهنمای دارویی در یک جعبه قرار می‌گیرد.

دپارتمان حمایت از بیماران فاران پلاس با هدف اطلاع‌رسانی‌های دارویی و پاسخگویی به سوالات بیماران مصرف‌کننده محصولات این شرکت فعالیت می‌کند. به منظور راهنمایی هر چه بهتر بیماران در تمامی مسیر درمان، با فاران پلاس (سامانه حمایت از بیماران) تماس بگیرید.

فاران

گروه مراقبت سلامت

Ref. :
BNF 73
Up to date
Martindale 2018

ساخت شرکت داروسازی فاران شیمی

تهران، میدان ونک، خیابان خداسی، خیابان نیروی انتظامی، بن بست کاوه، پلاک ۳

تلفن: ۰۲۱-۵۷۹۴۱۰۰۰ سامانه حمایت از بیماران: ۰۲۱-۵۷۹۴۱۴۴۴ www.faranshimi.com



Faran Shimi
Pharmaceutical Co.