

# Hyoscine N-butylbromide 10mg

## مشخصات دارو:

هر قرص روکشدار حاوی ۱۰ میلی گرم هیوسین ان - بوتیل بروماید به عنوان ماده موثره می باشد.

## راهنمای مصرف:

- بیمار گرمی، لطفاً پیش از مصرف، این برگه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
- این راهنما را نزد خود نگه دارید زیرا ممکن است به خواندن مجدد آن نیاز پیدا کنید.
- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.
- چنانچه سوال یا نکته مهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید یا پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

## موارد مصرف دارو:

هیوسین ان - بوتیل بروماید یک داروی آنتی اسپاسمودیک بوده که با کاهش انقباض عضلات شکم منجر به تسکین دردهای ناشی از انقباض عضلات دستگاه گوارشی و ادراری - تناسلی و اسپاسم های دوران قاعدگی می شود. این دارو به منظور تسکین علائم سندروم روده تحریک پذیر (IBS) نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

## موارد منع مصرف:

■ مصرف این دارو در صورت حساسیت به هیوسین ان - بوتیل بروماید یا هر یک از اجزاء این فرآورده، ابتلا به گلوکوم و سایر بیماری های چشم، میاستنی گراویس، انسداد روده، فلج ایلئوس، مگاکولون و هیپرتروفی انسدادی پروستات توصیه نمی شود.

## مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

■ مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

## هشدارها و موارد احتیاط:

- مصرف این دارو ممکن است سبب سرگیجه، خواب آلودگی و تاری دید شود لذا حین درمان با این دارو از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
- از مصرف همزمان این دارو با فرآورده های حاوی الکل خودداری نمایید.
- از مصرف همزمان این دارو با داروهای سرکوب کننده سیستم عصبی خودداری نمایید.
- در صورت ابتلا به بیماری های قلبی و ضربان قلب بالا، اختلال غده تیروئید (مانند فعالیت بیش از حد تیروئید)، اختلال یا درد هنگام دفع ادرار، ابتلا به مشکلات مربوط به پروستات، یبوست و تب قبل از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- در صورت تداوم دل درد یا بدتر شدن آن یا بروز تب، احساس بیماری یا ابتلا به بیماری، تغییر حرکات روده ای، ناراحتی شکمی، فشار خون پایین، احساس ضعف یا خون در مدفوع فوراً به پزشک یا داروساز مراجعه نمایید.

## تداخلات دارویی:

■ مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای جمله ضداسفردگی های چهار حلقه ای و سه حلقه ای (مثل دوکسین، آنتی هیستامین ها، داروهای کنترل کننده ضربان قلب (مثل کینیدین)، آنتی سایکوتیک ها (مثل هالوپریدول و فلوئنازین)، داروهای تنفسی (مثل تیوتروپیوم و ایپراتروپیوم)، متوکلوپرامید، آماتادین، آنکالوتیدهای بلائون، داروهای شبه آتروپین و سایر داروهای آنتی کولینرژیک می بایست با احتیاط و تحت نظر پزشک متخصص صورت گیرد.

# Hyoscine N-butylbromide 10mg

## مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید اما مقدار مصرف معمول قرص هیوسین ان-بوتیل بروماید به شرح ذیل است:

■ **بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال:** ۲ قرص ۴ بار در روز

در سندروم روده تحریک پذیر در صورت صلاحدید پزشک درمان با ۱ قرص ۳ بار در روز شروع شده و در صورت نیاز مقدار دارو افزایش می‌یابد.

■ **کودکان ۶-۱۲ سال:** ۱ قرص ۳ بار در روز

مصرف این دارو در کودکان زیر ۶ سال توصیه نمی‌شود.

در صورت فراموشی یک نوبت از مصرف دارو به محض یادآوری دوز فراموش شده را مصرف نمایید و دوز بعدی را طبق روال تجویز دارو ادامه دهید. اما اگر تقریباً زمان دوز بعدی دارو فراموشید از مصرف دوز فراموش شده خودداری نمایید و دوزهای بعدی را نیز دو برابر نسازید.

## ■ در صورت مصرف بیش از حد:

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده، بلافاصله جهت مشاوره با پزشک یا اورژانس تماس بگیرید (حتی اگر علائمی از ناراحتی یا مسمومیت وجود نداشته باشد).

## عوارض جانبی دارو:

■ هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه‌ی این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز عوارض زیر فوراً با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

واکنش‌های حساسیتی از جمله واکنش‌های پوستی (مثل راش، خارش و قرمزی پوست)، واکنش‌های حساسیتی شدید (مثل تنگی نفس، احساس ضعف و سرگیجه)، درد و قرمزی چشم همراه با کاهش بینایی.

سایر عوارض جانبی: خشکی دهان، تعریق غیرعادی یا کاهش تعریق، افزایش ضربان قلب و ناتوانی در دفع ادرار.

## شرایط نگهداری دارو:

■ دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

■ دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

■ دارو را در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید و از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

## بسته بندی:

قرص‌های روکش دار هیوسین ان-بوتیل بروماید توسط شرکت داروسازی فاران شیمی در بسته بندی های ۱۰۰ عددی عرضه می‌شود.

دپارتمان حمایت از بیماران فاران پلاس با هدف اطلاع‌رسانی‌های دارویی و پاسخگویی به سوالات بیماران مصرف‌کننده محصولات این شرکت فعالیت می‌کند. به منظور راهنمایی هر چه بهتر بیماران در تمامی مسیر درمان، با فاران پلاس (سامانه حمایت از بیماران) تماس بگیرید.

**فاران**  
گروه مراقبت سلامت

Ref. :  
BNF-78  
Martindale  
Uptodate  
TGA

ساخت شرکت داروسازی فاران شیمی



تهران، میدان ونک، خیابان خداسی، خیابان نیروی انتظامی، بن بست کاوه، پلاک ۳

تلفن: ۰۲۱-۵۷۹۴۱۰۰۰ سامانه حمایت از بیماران: ۰۲۱-۵۷۹۴۱۴۴۴ [www.faranshimi.com](http://www.faranshimi.com)

Faran Shimi  
Pharmaceutical Co.