

# Methadone 5,20,40

## مشخصات دارو:

هر قرص حاوی ۵ و ۲۰ یا ۴۰ میلی گرم متادون به عنوان ماده موثره می باشد.

## راهنمای مصرف:

- بیماران گرامی، لطفاً پیش از مصرف، این برگه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
- این راهنما را نزد خود نگه دارید زیرا ممکن است به خواندن مجدد آن نیاز پیدا کنید.
- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.
- چنانچه سوال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

## مسواک مصرف:

سم زدایی در اعتیاد به اوبوئیدها - کنترل درد متوسط تا شدید.

## موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت مفرط نسبت به هر یک از اجزای قرص، دارو منع مصرف دارد.  
از مصرف این دارو در صورتی که به ترکیبات اوبوئیدی حساسیت دارید خودداری نمایید.

## مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

- در بیمارانی که برای اولین بار از ضد دردهای اوبوئیدی استفاده می کنند، دوز تجویز دارو معمولاً به میزان ۵ تا ۱۰ میلی گرم هر ۸ تا ۱۲ ساعت می باشد که برای هر بیمار با توجه به پاسخ درمانی تنظیم می شود.
- در بیمارانی که از متادون جهت ترک اعتیاد استفاده می شود، دوز دارو بر اساس نظر پزشک تعیین می شود.
- قطع مصرف این دارو به علت امکان بروز سندروم ترک باید تحت نظر پزشک و به صورت تدریجی باشد.
- علائم ترک اوبوئیدها که در هنگام قطع مصرف دارو ممکن است بروز نمایند عبارت است از: کاهش ضربان قلب و تعداد تنفس، افت فشار خون، تعریق، تهوع، اسهال و از دست دادن مایعات بدن.
- قرص های متادون را همراه با مقدار کافی آب ببلعید و از جویدن قرص ها خودداری ننمایید.

## مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- طبقه بندی مصرف دارو در دوران بارداری: جزء گروه C می باشد.
- مطالعات کافی و جامع از مصرف دارو در خانم های باردار در دسترس نیست.
- مصرف این دارو در دوران بارداری تنها در موارد اضطراری و با نظر پزشک متخصص باید انجام شود. در دوران شیردهی به دلیل ترشح دارو در شیر مادر، منع مصرف دارد.

## هشدارها و احتیاط:

- احتمال بروز وابستگی روانی، فیزیکی، اعتیاد و سوء مصرف به قرص متادون وجود دارد.
- مواردی از ضعف تنفسی شدید و مرگ در صورت مصرف بیش از حد دارو به تنهایی یا همراه با دیگر داروهای تضعیف کننده سیستم عصبی مرکزی (از جمله الکل) گزارش شده است.
- مصرف این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی یا کلیوی طبق نظر پزشک و با تعدیل دوز باید انجام شود.
- مواردی از طولانی شدن ریتم قلبی و آریتمی یا مصرف دوزهای بالای این دارو به خصوص در افرادی که به طور همزمان از داروهای دیورتیک استفاده کرده یا هیپوکالمی (کاهش پتاسیم در خون)، هیپومگنیزمی (کاهش منیزیم در خون) و هیپرتروفی قلب (بزرگ شدن بیش از حد قلب) دارند، مشاهده شده است.
- مصرف این دارو در بیمارانی که دیگر اوبوئیدها، بیهوش کننده های عمومی، فنوتیازین ها، خواب آورها، ضد افسردگی های سه حلقه ای و دیگر داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی (از جمله الکل) را مصرف می کنند، باید با احتیاط و با کاهش دوز صورت پذیرد. بی خطر بودن و کارایی این دارو برای کودکان به اثبات نرسیده است.

## در موارد زیر دارو باید با احتیاط مصرف شود:

نارسایی ریوی، آسم و دیگر اختلالات تنفسی، آسیب به سر و افزایش فشار داخل جمجمه ای، سابقه بیماری های قلبی و آریتمی، سابقه اختلالات تشنجی، در افراد سالمند و ناتوان، در دوران بارداری و شیردهی، بالا بودن فشار داخل چشم، الکلیسم حاد، کم کاری غده

# Methadone 5,20,40

تیروئید، بیماری آدیسون، کیفوسکولوز، هیپرتروفی پروستات، انسداد مجاری ادراری، گرفتگی عروق مغزی و التهاب دستگاه گوارش.

## تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع سازید.  
تقویت اثر بخشی داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی همچون الكل، خواب آورها، داروهای ضد اضطراب و بیهوش کننده ها، داروهای القا کننده انزیم های کبدی همچون کاربامازپین، باربیتورات ها، ریفامپیسین و ... با افزایش متابولیسم کبدی متادون، منجر به کاهش اثربخشی این دارو می شوند.

داروهای مهار کننده انزیم های کبدی همچون ضد قارچ های آزولی، آنتی بیوتیک های ماکرولیدی، کلرامفنیکل و ... با کاهش متابولیسم کبدی متادون، منجر به افزایش اثر بخشی این دارو می شوند.

## عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

**شایع ترین:** اریتمی و نامنظم شدن ریتم قلب، اضطراب، ضعف و سستی، سرگیجه، سردرد، برادی کاردی یا تاکی کاردی، کاهش فشارخون، بیوست، خشکی دهان، کرامپ های شکمی، تهوع و استفراغ، تعریق، خارش پوست و ادم.

**عوارض جدی و خطرناک:** دبرسیون تنفسی، دبرسیون قلبی، آپنه، کما، شوک و هیپووتنزیاسیون (کاهش حجم هوای تنفسی)

علامه مصرف بیش از حد: دبرسیون تنفسی، افت فشارخون، تنگی مردمک چشم، گشاد شدن عروق و کما.

**در صورت مصرف بیش از حد توصیه شده، سریعا به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمائید.**

## شرایط نگهداری دارو:

- دارو را دور از نور مستقیم، رطوبت، حرارت و دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید و اطمینان داشته باشید که داروهای تاریخ گذشته دور از دسترس کودکان قرار دارند.
- قرص متادون باید در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و در بسته بندی اصلی دارو نگهداری شود.

## بسته بندی:

قرص های متادون ۵، ۲۰ و ۴۰ میلی گرمی تولید فاران شیمی در بسته بندی های زیر عرضه می گردد:  
۱۰ قرص در یک بلیستر و هر ۱۰ بلیستر به همراه یک بروشور درون جعبه.

دبیرتسمان حمایت از بیماران فسانان پلاس با هدف اطلاع رسانی های دارویی و پاسخگویی به سوالات بیماران مصرف کننده محصولات این شرکت فعالیت می کند. به منظور راهنمایی هر چه بهتر بیماران در تمامی مسیر درمان، با فاران پلاس (سامانه حمایت از بیماران) تماس بگیرید.

# فاران

گروه مراقبت سلامت

## Ref. :

Drug facts and Comparisons, 2010,  
pages: 1145, 1148-1165, 1178  
Martindale, the complete drug  
reference, 36 Ed, pages: 82-85

ساخت شرکت داروسازی فاران شیمی



تهران، میدان ونک، خیابان خامی، خیابان نیروی انتظامی، پن بسته کوه پلاک ۳

تلفن: ۰۲۱-۵۹۶۱۰۰۰ سامانه حمایت از بیماران: ۰۲۱-۵۹۶۱۴۴۴ www.faranshimi.com

Faran Shimi  
Pharmaceutical Co.