



# Miglusca 100mg

Miglustat

## مشخصات دارو:

هر کپسول میگلوסקا حاوی ۱۰۰ میلی گرم میگلوستات به عنوان ماده موثره می باشد.

## راهنمای مصرف:

- بیمار گرامی، لطفاً پیش از مصرف، این برگه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.
- این راهنما را نزد خود نگه دارید زیرا ممکن است به خواندن مجدد آن نیاز پیدا کنید.
- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.
- چنانچه سوال یا نکته مهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

## منابع مصرف:

میگلوستات یک مهارکننده آنزیم گلوکوزیل سرامید سنتتاز است که برای درمان نوع خفیف تا متوسط تیپ ۱ بیماری گوشه (Gaucher Disease) در بزرگسالان و همچنین درمان علائم عصبی پیشرونده در نوع C بیماری نیمین پیک (Niemann-Pick Disease) در کودکان و بزرگسالان مورد استفاده قرار می گیرد.

## موارد منع مصرف:

مصرف این دارو در صورت حساسیت به میگلوستات یا هر یک از اجزاء این فرآورده، توصیه نمی شود.

## مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید اما مقدار مصرف معمول کپسول میگلوסקا به شرح ذیل است:

- تیپ ۱ بیماری گوشه در بزرگسالان: یک کپسول (۱۰۰ میلی گرم) هر ۸ ساعت
  - نوع C بیماری نیمین پیک در بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۲ سال: دو کپسول (۲۰۰ میلی گرم) هر ۸ ساعت
- میزان مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۱۲ سال مبتلا به نوع C بیماری نیمین پیک را پزشک تعیین می کند.
- در صورت ابتلا به بیماری های کلیوی ممکن است درمان با دوز کمتری آغاز گردد.
- در صورت بروز اسهال حین درمان با این دارو ممکن است پزشک دوز مصرف دارو را کاهش دهد.
- میگلوסקا را می توان همراه با غذا یا بدون غذا مورد استفاده قرار داد. مصرف این دارو همراه با غذا می تواند باعث کاهش وقوع اسهال گردد.
- کپسول را به طور کامل و با یک لیوان آب بلعید.
- دارو را در زمان مشخص و در فواصل زمانی منظم در طول روز مصرف نمایید.
- این فرآورده فاقد گلوتن بوده و در بیماران مبتلا به سلیاک قابل استفاده می باشد.
- بدون بررسی و نظر پزشک، مصرف دارو را متوقف ننمایید.
- در صورت فراموشی یک نوبت از مصرف میگلوסקا، دارو را مطابق دستور قبلی ادامه دهید. از مصرف دوز فراموش شده خودداری نمایید و دوز بعدی را نیز دوبرابر نکنید.

## مصرف بیش از حد:

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده، بلافاصله جهت مشاوره با پزشک یا اورژانس تماس بگیرید حتی اگر علائمی از ناراحتی یا مسمومیت وجود نداشته باشد.

## مصرف در کودکان:

ایمنی و اثربخشی این دارو در کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال مبتلا به تیپ ۱ بیماری گوشه به اثبات نرسیده است.

## مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری، شیردهی و یا برنامه ریزی برای بارداری توصیه نمی شود. در صورت بارداری، شیردهی و یا اقدام برای بارداری با پزشک خود مشورت نمایید.

## هشدارها و احتیاط:

- در صورت ابتلا به بیماری های کلیوی، کبدی و همچنین بیماری های گوارشی (از جمله بیماری التهابی روده IBD) قبل از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- عملکرد اعصاب دست و پا، میزان رشد کودکان و نوجوانان مبتلا به تیپ C بیماری نیمی پیک، میزان ویتامین B12 و همچنین میزان پلاکت خون، قبل و حین درمان با میگلوستات مورد بررسی قرار می گیرد.
- در صورت بروز بی حسی یا گزگز دست و پا، بروز لرزش یا بدتر شدن آن و یا کاهش وزن بدن حین درمان با این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.
- در صورت بروز اسهال یا پزشک خود مشورت نمایید. در این شرایط، پزشک ممکن است میزان لاکتوز و کربوهیدرات رژیم غذایی مانند ساکارز (قند نیشکر) را کاهش دهد. همچنین ممکن است مصرف میگلوستات بدون غذا، کاهش موقتی دوز دارو و یا در برخی موارد مصرف داروهای ضداسهال مانند لوبرامید تجویز گردد. در صورت عدم بهبود اسهال با اقدامات درمانی مذکور و یا بروز دیگر ناراحتی های شکمی با پزشک خود مشورت نمایید.
- در زمان مصرف این دارو از روش های موثر جهت جلوگیری از بارداری استفاده نمایید.
- بیماران مرد می بایست در حین درمان با میگلوستات و همچنین ۳ ماه پس از اتمام درمان با این دارو، از روش های موثر جلوگیری از بارداری استفاده نمایند.
- مصرف این دارو ممکن است سبب سرگیجه گردد لذا حین درمان با این دارو از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.

## تداخلات دارویی:

مصرف هم زمان میگلوستات با سایر داروها از جمله ایمیگلسراز می بایست با احتیاط و تحت نظر پزشک متخصص صورت گیرد.

## عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

- **عوارض جانبی جدی:** گزگز یا بی حسی دست و پا و لرزش.
- **عوارض جانبی بسیار شایع:** اسهال، نفخ، درد شکمی، کاهش وزن و کاهش اشتها.
- **عوارض جانبی شایع:** سردرد، سرگیجه، پاراستزی (خواب رفتگی اندام ها)، عدم تعادل، هیپوسیتزیا (کاهش حس لامسه)، سوءهاضمه (سوزش معده)، تهوع، یبوست و استفراغ، تورم یا ناراحتی در شکم و ترومبوسیتوپنیا (کاهش سطح پلاکت خون).
- **سایر عوارض جانبی:** اسپاسم یا ضعف عضلانی، کسالت، خستگی و لرز، افسردگی، مشکلات خواب، فراموشی و کاهش میل جنسی.

## شرایط نگهداری دارو:

دارو را در بسته بندی اصلی خود، دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

دارو را دور از دید و دسترسی کودکان نگهداری نمایید.

## بسته بندی:

کپسول های میگلوستات با نام تجاری میگلسکا توسط شرکت داروسازی فاران شیمی در بسته بندی های ۴۲ عددی عرضه می شود.