



Pelaroka

Cough & Cold kids

راهنمای مصرف:

لطفا پیش از مصرف، این برگه راهنما را به دقت مطالعه نمایید. این راهنما را نزد خود نگه دارید زیرا ممکن است به خواندن مجدد آن نیاز پیدا کنید. چنانچه سوال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این فرآورده به نظرتان رسید با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.



شریت پلاروکا کیدز حاوی ۱۶۱ میلی گرم عصاره خشک ریشه پلارگونوم سیدوایدس (حاوی حداقل ۲۴۰ میکروگرم اومکالین در هر ۱۰۰ میلی لیتر شریت)، ۶۰۰ میلی گرم عصاره میوه الدربری، ۷۲۰ میلی گرم ویتامین C و ۱۸۴ میلی گرم زینک گلوکونات (معادل ۲۶ میلی گرم زینک المتال) در هر ۱۲۰ میلی لیتر، به عنوان ماده موثره می باشد و برای بهبود علائم سرماخوردگی و تقویت سیستم ایمنی در کودکان بالای ۱ سال مبتلا به سرماخوردگی تجویز می گردد.

پلارگونوم سیدوایدس گیاه دارویی بومی آفریقای جنوبی است و از دیر باز عصاره ریشه این گیاه در درمان سرماخوردگی و آنفولانزا و بهبود علائم ناشی از عفونت های دستگاه تنفس مورد استفاده قرار می گرفته است. آقطی سیاه (پلک الدربری) حاوی فلاونوئیدهای طبیعی از جمله آنتوسیانین است که سیستم ایمنی را تقویت می کند و دارای اثرات ضدالتهابی و ضدویروسی می باشد.

زینک و ویتامین ث موجود در شریت نیز به تقویت سیستم ایمنی و محافظت سلول ها در برابر رادیکال های آزاد کمک می کند. این فرآورده نه تنها به بهبود علائم ناشی از عفونت های دستگاه تنفسی کمک می کند، بلکه منجر به تسریع روند بهبود بیماری در کودکان نیز خواهد شد.

موارد مصرف:

به عنوان موکولیتیک (خلط آور)، تقویت کننده سیستم ایمنی، کمک به بهبود علائم عفونت های دستگاه تنفسی شامل آنفولانزا، سرماخوردگی، گلو درد، سرفه، آبریزش بینی، گرفتگی بینی و همچنین به عنوان درمان کمکی در برونشیت حاد و سینوزیت در کودکان استفاده می گردد.

موارد منع مصرف:

- در صورت حساسیت به هریک از اجزاء این فرآورده از مصرف آن خودداری نمایید.
- در صورت ابتلا به بیماری های کبدی، کلیسوی و بیماری های خودایمنی از جمله مالتیپل اسکلروزیس (MS)، لوپوس اریتماتوز سیستمیک و آرتریت روماتوئید، از مصرف این فرآورده خودداری نمایید.



مقدار و نحوه مصرف:

پلاروکا کیدز را مطابق آنچه در این برگه راهنما توضیح داده شده است مورد استفاده قرار دهید. مصرف معمول این فرآورده به شرح ذیل است مگر اینکه پزشک شما دستور مصرف دیگری را تجویز کرده باشد:

- کودکان ۱ تا ۶ سال: ۵ میلی لیتر ۳ بار در روز.
- کودکان ۶ تا ۱۲ سال: ۱۰ میلی لیتر ۳ بار در روز.

از مصرف این فرآورده در کودکان زیر ۱ سال خودداری نمایید.

- میانگین مدت زمان مصرف این محصول ۷ روز می باشد.
- قبل از مصرف، بطری را خوب تکان دهید.
- در صورت فراموشی یک نوبت از مصرف فرآورده به محض یادآوری دوز فراموش شده را مصرف ننمایید و دوز بعدی را طبق روال معمول ادامه دهید. اما اگر تقریباً زمان دوز بعدی فرارسید از مصرف دوز فراموش شده خودداری نمایید و دوز بعدی را نیز دوبرابر نسازید.
- در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده، با پزشک یا داروساز تماس بگیرید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مطالعات کافی و کنترل شده در مورد مصرف این فرآورده طی دوران بارداری و شیردهی، انجام نشده است لذا مصرف آن طی این دوران توصیه نمی شود.

هشدارها و احتیاط:

- از مصرف بیش از مقدار توصیه شده خودداری نمایید.
- در صورت ابتلا به هرگونه بیماری یا مصرف هرگونه دارو، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- مصرف همزمان این فرآورده در بیماران که از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده می کنند، توصیه نمی شود.
- در صورت تداوم یا تشدید علائم بیماری با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- در صورت بروز علائمی مانند زردی چشم ها و پوست، تهوع، استفراغ، ادرار تیره، دردهای شکمی، خستگی غیرطبیعی و از دست دادن اشتها، مصرف فرآورده را فوراً قطع کرده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- این فرآورده ممکن است خطر خونریزی در طول اقدامات جراحی را افزایش دهد، بنابراین ۲ هفته قبل از جراحی، استفاده از آن را متوقف نمایید.



تداخلات دارویی:

مصرف هم زمان این فرآورده با داروهای مشابه و همچنین داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی می بایست با احتیاط و تحت نظر پزشک معالج صورت گیرد.

عوارض جانبی:

مانند سایر فرآورده ها، این فرآورده نیز ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشد. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، اما در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

- در صورت مصرف بیش از حد ممکن است علائم ضعف، گیجی، کرختی، افزایش ادرار یا عوارض گوارشی بروز کند.
- عوارض جانبی غیر شایع (بیشتر از ۱ نفر در ۱۰۰۰ نفر اما کمتر از ۱ نفر در ۱۰۰ نفر): مشکلات گوارشی مانند معده درد، سوزش سردل، تهوع، اسهال، استفراغ و مشکل در بلع.
- عوارض جانبی نادر (بیشتر از ۱ نفر در ۱۰۰۰۰ نفر اما کمتر از ۱ نفر در ۱۰۰۰۰ نفر): خونریزی ملایم از لثه ها و بینی، واکنش های آلرژیک مانند راش پوستی، کهیر، خارش پوست و غشای موکوسی.
- عوارض جانبی بسیار نادر (۱ نفر و یا کمتر از ۱ نفر در ۱۰۰۰۰ نفر): واکنش های شدید حساسیتی همراه با تورم صورت، تنگی نفس و افت فشار خون.

شرایط نگهداری:

فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری ننمایید. این فرآورده تا ۶ ماه پس از باز نمودن درب بطری قابل استفاده است.

بسته بندی:

شریت پلاروکا کیدز توسط شرکت داروسازی فاران شیمی تولید شده و هر بطری ۱۲۰ میلی لیتری در یک جعبه به همراه یک برگه راهنما قرار می گیرد.

فاران+

گروه مراقبت سلامت

ساخت شرکت داروسازی فاران شیمی

تهران، میدان ونک، خیابان خدای، خیابان نیروی انتظامی، بن بست کاوه، پلاک ۳
تلفن: ۰۲۱۹۴۱۰۰۰۰ سامانه حمایت از بیماران: ۰۲۱۹۴۱۴۴۴
www.pelaroka.com

چهارمجان حمایت از بیماران فاران پلاس با هدف اطلاع رسانی های دارویی و پاسخگویی به سوالات بیماران مصرف کننده محصولات این شرکت فعالیت می کند. به منظور راهنمایی هر چه بهتر بیماران در تماسی مسیر درمان، با فاران پلاس (سامانه حمایت از بیماران) تماس بگیرید.