

Renofa 800 mg

Sevelamer Carbonate

مشخصات دارو:

هو قرص روکشدار حاوی ۸۰۰ میلی گرم سولامر به صورت کربنات به عنوان ماده موثره می باشد.

راهنمای مصرف:

- بیمار گرامی، لطفاً پیش از مصرف، این برگ راهنمای را به دقت مطالعه فرمایید.
- این راهنمای را نزد خود نگه دارید زیرا ممکن است به خواندن مجدد آن نیاز پیدا کنید.
- دارو همراه با غذا میل شود.
- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
- بیمارانی که انسداد روده دارند.
- بیمارانی که مشکلات گوارشی دارند.
- کسانی که دچار کمبود ویتامین های A, K, D, E, اسید فولیک و کلسیم هستند.
- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه با توصیه آن به دیگران جدا خودداری نمایید.
- جانچه سوال یا نکته مهتمی در مورد مصرف این دارو به تظرتان رسید با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

موارد مصرف دارو:

- سولامر در کنترل غلظت فسفات سرم در افراد دیالیزی که مبتلا به بیماری مزمن کلیوی (CKD) هستند، استفاده می شود.
- اینمی و اثر یخشی این دارو در افراد غیر دیالیزی بررسی نشده است.

موارد منع مصرف:

- در شرایط انسداد روده یا بیماران مبتلا به هیپوفسفاتمی نباید مصرف شود.

صرف در دوران بارداری و شیردهی:

- سولامر در رده C بارداری طبقه بندی شود، لذا تجویز آن در این دوره باید با احتیاط و تحت نظر پزشک صورت گیرد.
- در دوران شیردهی تحت نظر پزشک مصرف شود و منافع آن در برابر زیان ها سنجیده شود.

هشدارها و موارد احتیاط:

- در صورت کمبود ویتامین های A, K, E, D, اسید فولیک و کلسیم و ابتلا به مشکلات گوارشی، قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.
- بی خطری سولامر در بیماران با اختلالات بلع، هضم، اختلالات حرکتی شدید گوارشی شامل یبوست شدید و یا جراحی های عمدۀ لوله گوارشی ثابت نشده است.
- در طول مصرف این دارو ویتامین های A, K, E, D, سطح اسید فولیک، بی کربنات، کلر و کلسیم سرم پایش شود.

تداخلات داروبی:

- مصرف همزان با سیپروفلوکساسین باعث کاهش فراغمی زیستی سیپروفلوکساسین می شود.
- در صورت استفاده هم‌زمان این دارو با داروهای مربوط به آریتی قلبی یا صرع، با پزشک معالج مشورت گردد.
- اثرات داروهایی مانند سیکلوسپورین، مایکوفنولات، فکتیل و تاکرولیموس (داروهای مورد استفاده بیماران پیوند) ممکن است توسط سولامر کاهش یابد. در صورت مصرف این داروها، استفاده از سولامر باید تحت نظر پزشک صورت گیرد.

Renofa 800 mg

Sevelamer Carbonate

استفاده همزمان از لووتیروکسین (هورمون تیروئید) و سولامر، می‌تواند موجب افزایش سطح هورمون تحریک کننده تیروئید (TSH) شود، بنابراین ممکن است لازم باشد که پزشک معالج پایش بیشتری بر روی سطوح TSH در خون بیمار اعمال نماید.

مقادیر و نحوه مصرف دارو:

- میزان و نحوه مصرف دارو برای هر بیمار، توسط پزشک متخصص تعیین می‌شود اما میزان مصرف روتین دارو به شرح زیر می‌باشد:
 - برای بیماران دارای نارسایی پیشرفتة کلیوی، همودیالیزی یا دارای هاپر فسفاتمیا و شروع درمان با سولامر کربنات.
 - سطح سرمی فسفات، بین ۵/۵ - ۷/۵ میلی گرم بر دسی لیتر: سه بار در روز هر بار ۱ عدد قرص رنوفا همراه با غذا.
 - سطح سرمی فسفات بین ۷/۵ - ۹ میلی گرم بر دسی لیتر: سه بار در روز هر بار ۲ عدد قرص رنوفا با غذا.
 - سطح سرمی فسفات بیشتر از ۹ میلی گرم بر دسی لیتر: سه بار در روز هر بار ۳ عدد قرص رنوفا همراه با غذا.
- میزان مصرف سولامر کربنات در ادامه درمان بر حسب سطح سرمی فسفات خون توسط پزشک متخصص تعیین می‌شود.

عواض جانبی دارو:

- هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته شود.
- اگر چه همه این عوارض در یک فرد ظاهر نمی‌شود اما در صورت بروز هر کدام از عوارض زیر بلافضله به پزشک اطلاع دهید:
- استفراغ، تهوع، اسهال، درد معده، درد شکمی، نفخ شکمی، یبوست، موارد غیر معمول یبوست، انسداد و سوراخ شدن روده، خارش، بشورات، پریتوئیت در بیماران همودیالیزی و دیالیز صفاقی.

مسامونی:

- حداکثر دوز روزانه ۱۴ گرم سولامر کربنات مبایشد، اما با توجه به عدم جذب سولامر احتمال سامنیت سیستمیک آن پایین است.

شرط نگهداری دارو:

- دارو از نور مستقیم، رطوبت، حرارت و دور از دسترس کودکان فرار دهید.
- از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید و مطمئن باشید که داروهای تاریخ گذشته دور از دسترس اطفال قرار ندارند.

بسنته بندی:

- قرص روكشدار سولامر ۸۰۰ میلی گرمی توسط شرکت داروسازی فاران شیمی تولید شده و هر ۱۵ عدد قرص در یک بليستر و هر ۴ بليستر به همراه یک برگه راهنمای در یک جعبه قرار می‌گيرد.

Ref. :

Drug facts and comparisons, 2008, pages: 517, 529, 530, 539-544
Martindale, the complete drug reference, 36 Ed, pages: 103 - 107

ساخت شرکت داروسازی فاران شیمی



تهران، میان ونک، خیابان خدامی، خیابان نیروی انتظامی، بن بست کاوه، پلاک ۳

تلفن: ۰۵۷۹۴۱۰۰۰ سامانه حمایت از بیماران: www.faranshimi.com ۰۵۷۹۴۱۴۴۴